

Néophytes  
envahissantes  
avant la floraison

Erwin Jörg



## Impressum

### Néophytes envahissantes avant la floraison

De plus amples informations sous [www.neophyt.ch](http://www.neophyt.ch).

#### Éditeur

Erwin Jörg

[www.neophyt.ch](http://www.neophyt.ch)

#### Images & mise en page

Erwin Jörg

Version 1.1, avril 2022

Photo de couverture: le robinier ou faux acacia (*Robinia pseudacacia*) est une espèce de néophyte envahissante commune en Suisse.

## Sommaire

Impressum	2
Sommaire	3
Berce du Caucase ( <i>Heracleum mantegazzianum</i> )	4
Solidage du Canada et Solidage géant ( <i>Solidago canadensis</i> et <i>S. gigantea</i> )	5
Impatiente glanduleuse ( <i>Impatiens glandulifera</i> )	6
Renouées asiatiques ( <i>Reynoutria japonica</i> et <i>R. sachalinensis</i> )	7
Renouée à épis nombreux ( <i>Polygonum polystachyum</i> )	8
Ambroisie élevée ou Ambroisie à feuilles d'armoise ( <i>Ambrosia artemisiifolia</i> )	9
Robinier faux acacia ( <i>Robinia pseudoacacia</i> )	10
Fausse massette ( <i>Rhus typhina</i> )	11
Faux vernis du Japon ou Ailante ( <i>Ailanthus altissima</i> )	12
Laurier-cerise ( <i>Prunus laurocerasus</i> )	13
Senéçon sud-africain ( <i>Senecio inaequidens</i> )	14
Senéçon de Jacob ( <i>Senecio jacobaea</i> )	15
Vergereffe annuelle ( <i>Erigeron annuus</i> )	16
Buddleia de David ( <i>Buddleja davidii</i> )	17
Chèvrefeuille de Henry ( <i>Lonicera henryi</i> )	18
Paulownia ( <i>Paulownia tomentosa</i> )	19
Vigne vierge ( <i>Parthenocissus inserta</i> )	20
Ronce d'Arménie ( <i>Rubus armeniacus</i> )	21
Armoise des frères Verlot ( <i>Artemisia verlotiorum</i> )	22
Asclépiade de Syrie ou Herbe à la ouate ( <i>Asclepias syriaca</i> )	23
Peste d'eau ou Élodée du Canada ( <i>Elodea canadensis</i> )	24
Myriophylle aquatique ( <i>Myriophyllum aquaticum</i> )	25
Jussie à grandes fleurs ( <i>Ludwigia grandiflora</i> )	26
Cerisier tardif ( <i>Prunus serotina</i> )	27



## Berce du Caucase (*Heracleum mantegazzianum*)

Interdit selon l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement



Semis



Berce commune indigène

Plante annuelle





**Solidage du Canada et Solidage géant (*Solidago canadensis* et *S. gigantea*)**

Interdit selon l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement



Solidage du Canada: tige poilue

Solidage géant: tige sans poils





**Impatiante glanduleuse (*Impatiens glandulifera*)**

Interdit selon l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement



Semis

Glandes rouges





Renouées asiatiques (*Reynoutria japonica* et *R. sachalinensis*)

Interdit selon l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement



Renouée du Japon

Renouée de Sakhaline





**Renouée à epis nombreux (*Polygonum polystachyum*)**

Interdit selon l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement





**Ambrosie élevée ou Ambrosie à feuilles d'armoise (*Ambrosia artemisiifolia*)**

Interdit selon l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement



Feuilles similaires: Armoise commune, cf. page 22



Tige poilues et souvent rouges à la base





**Robinier faux acacia (*Robinia pseudoacacia*)**

Présent sur la liste noire



Feuilles sans dents latérales et arrondies

Épines à l'aisselle des feuilles





**Fausse massette (*Rhus typhina*)**


Interdit selon l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement



Feuilles avec dents latérales



Jeunes tiges avec poiles





## Faux vernis du Japon ou Ailante (*Ailanthus altissima*)


Présent sur la liste noire



Feuilles asymétriques et sans dents latérales



Glandes sur la surface inférieure de la feuille





Laurier-cerise (*Prunus laurocerasus*)

Présent sur la liste noire



Pervenche, feuilles coriaces





## Seneçon sud-africain (*Senecio inaequidens*)

Interdit selon l'Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement



Base ligneuse bourgeonne à nouveau après fauche

Longues feuilles étroites jusqu'à 7 cm





## Seneçon de Jacob (*Senecio jacobaea*)

Indigène et toxique



Rosette survit l'hiver





## Vergerette annuelle (*Erigeron annuus*)

Présent sur la liste noire



Rosette survit l'hiver

Toute la plante couverte de poils





**Buddleia de David (*Buddleja davidii*)**

Présent sur la liste noire



Feuilles vertes, surfaces inférieures poilues et blancstamenteux

Feuilles peuvent survivre l'hiver





## Chèvrefeuille de Henry (*Lonicera henryi*)

Présent sur la liste noire



Feuilles en hiver




Feuilles au printemps





**Paulownia (*Paulownia tomentosa*)**

Présent sur la watch liste



Forme des feuilles peut varier fortement, surfaces inférieures poilues et blancstomenteux





## Vigne vierge (*Parthenocissus inserta*)

Présent sur la watch liste



Vrilles sans ou avec des crampons peu développés





**Ronce d'Arménie (*Rubus armeniacus*)**

Présent sur la liste noire



Base des épines rouge



Surfaces inférieures blancstomenteux





## Armoise des frères Verlot (*Artemisia verlotiorum*)

Présent sur la liste noire



Feuille sans dents latérales



Risque de confusion avec l'Armoise commune





## Asclépiade de Syrie ou Herbe à la ouate (*Asclepias syriaca*)

Présent sur la liste noire



Feuilles lancéolées et surfaces inférieures duveteuses



Plante avec latex





## Peste d'eau ou Élodée du Canada (*Elodea canadensis*)

Présent sur la liste noire



Tige avec feuilles éparties uniformément



Feuilles 1–5 mm de largeur (largeur de max. 2 mm pour l'Élodée de Nuttall, également envahissante)





## Myriophylle aquatique (*Myriophyllum aquaticum*)

Présent sur la liste noire



Densément feuillée, feuilles apparemment hydrophobes



Feuilles sous l'eau moins dense et pas vertes





## Jussie à grandes fleurs (*Ludwigia grandiflora*)

Présent sur la liste noire



Forme une masse racinaire dense



Tige rampante





**Cerisier tardif (*Prunus serotina*)**

Présent sur la liste noire



Feuilles coriaces et surface des feuilles brillante





